

## 95 年度 11 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 95 年 12 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 對於 Stage A 的心衰竭患者，下列哪一種為非 guideline 建議的藥物？
- (a) Atenolol 。
  - (b) Carvedilol 。
  - (c) Propranolol 。
  - (d) Labetalol 。
  - (e) Metoprolol tartrate 。
- ( ) 2. 在 stage B 的心衰竭患者，下列何者可作為第一線治療藥物？
- (a) ACEI 。
  - (b) ARB 。
  - (c) All of above 。
  - (d) none of above 。
- ( ) 3. 在 stage C 合併左心射出率降低的患者，下列何種情形不建議使用醛固酮拮抗劑 (aldosterone) ？
- (a) 肌酸酐 (creatinine)，男性小或等於 2.5 mg/dL 。
  - (b) 肌酸酐 (creatinine)，女性要小或等於 2.0 mg/dL 。
  - (c) 血鉀須小於 5.0 mEq/L 。
  - (d) 患者無法接受臨床追蹤血鉀與腎功能 。
  - (e) 以上皆是 。

- ( ) 4. 在 stage C 合併左心射出率降低的患者，下列何種情形不建議使用接受心室同步化治療？
- (a) LVEF  $\leq$  35% 。
  - (b) Atrial fibrillation 。
  - (c) QRS duration 超過 120 msec 。
  - (d) NYHA functional class II 。
  - (e) 以上皆是 。
- ( ) 5. 毛地黃在治療心衰竭的治療角色，下列何者為非？
- (a) 毛地黃可降低心衰竭的住院率 。
  - (b) 毛地黃可改善心衰竭患者的存活率 。
  - (c) 毛地黃可給予心衰竭併心房顫動患者 。
  - (d) 毛地黃不應該使用在沒有心衰竭症狀，仍然是竇性心律的患者，即使其 LVEF 已經降低 。
  - (e) 以上皆是 。

### 〔九十五年十月份通訊教育解答〕

1. ( d )
2. ( d )
3. ( b )
4. ( b )
5. ( e )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (95.11)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____