

## 96 年度 6 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 96 年 7 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 病人有二尖瓣膜狹窄，考慮使用抗凝血劑，何者有誤？
- (a) 合併心房顫動。
  - (b) 先前曾有栓塞病史
  - (c) 合併左心房血栓
  - (d) 以上皆是。
- ( ) 2. 二尖瓣膜狹窄病人，適合接受經皮二尖瓣膜氣球切開術，何者有誤？
- (a) 左心房血栓。
  - (b) 沒有中度二尖瓣逆流。
  - (c) 有症狀的病人合併中度二尖瓣膜狹窄
  - (d) 沒有症狀的中度二尖瓣膜狹窄，其肺動脈收縮壓在休息時大於 50 mmHg。
- ( ) 3. 心臟超音波診斷二尖瓣膜脫垂標準，包括瓣膜脫垂超過二尖瓣環部多少？
- (a) 1 mm 以上。
  - (b) 2 mm 以上
  - (c) 3 mm 以上
  - (d) 4 mm 以上。

- ( ) 4. 在二尖瓣脫垂合併心房顫動時建議使用 Warfarin，何者有誤？
- (a) 年紀小於 65 歲
  - (b) 病人有高血壓
  - (c) 病人有二尖瓣逆流雜音
  - (d) 病人有心臟衰竭病史
- ( ) 5. 在慢性嚴重度二尖瓣逆流且有症狀的病人，何時二尖瓣膜手術是沒有益處？
- (a) 左心室收縮末期腔徑小於 55 mm
  - (b) 症狀為 NYHA Fc II。
  - (c) 左心室射出率小於 30%
  - (d) 症狀為 NYHA Fc IV

〔九十六年五月份通訊教育解答〕

- 1. ( d )
- 2. ( c )
- 3. ( d )
- 4. ( c )
- 5. ( b )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (96.6)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_