

98年2月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於98年03月25日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 經歷心跳停止及復甦急救後，恢復自發性循環而住院的患者，其院內死亡率約為多少？
- (a) 5~10%
 - (b) 25~35%
 - (c) 60~75%
 - (d) 85~90%
- () 2. 關於心跳停止及復甦急救後所導致的心肌功能異常，下列何者為非？
- (a) 常是造成患者死亡的重要因素。
 - (b) 是對藥物治療無反應的。
 - (c) 須找出導致及加重心肌功能失常的因子，如急性冠狀動脈疾病。
 - (d) 部份患者在72小時後心肌功能可有顯著恢復。
- () 3. 關於心跳停止後症候群之治療，下列何者為非？
- (a) 低溫治療是經實證醫學驗證，可改善患者長期預後的治療。
 - (b) 心跳停止患者，在恢復自發性循環且意識不清的患者，應即刻施與低溫治療將體溫降至32~34°C，並持續12~24小時以上。
 - (c) 在降溫的過程中，使用肌肉鬆弛劑減少肌肉顫抖的產熱是有效的。
 - (d) 原則是降溫速度要慢，回溫速度要快。
- () 4. 心跳停止的發生與急性冠心症之描述，下列何者為非？
- (a) 無明顯非心因性原因的患者，其合併有顯著冠狀動脈疾病之機會小於百分之二十。

- (b) 合併有STEMI的患者，其primary PCI成功率可達8至9成。
 - (c) 針對發生心跳停止患者，胸痛及ST段上升皆非急性冠狀動脈阻塞之良好指標。
 - (d) 接受PCI治療的患者，若同時施與低溫治療，則可顯著改善長期神經學之預後。
- () 5. 心跳停止患者的治療及預後，下列何者為是？
- (a) 患者是否會清醒，在恢復自發性循環初期即可以預測。
 - (b) 目前並無準確可早期（72小時內）預測長期存活預後之工具及方式，對於治療並非明顯無效的患者，早期積極醫療及照護是必須的。
 - (c) 不論是什麼情形引發之心跳停止，皆應施與心肺復甦急救並積極給予後續之治療。
 - (d) 對於初期意識無恢復的患者，不應立即施與心導管手術及PCI，應等意識確能恢復再執行，免增社會及家庭負擔。

〔九十八年一月份通訊教育解答〕

- 1. (d)
- 2. (a)
- 3. (c)
- 4. (c)
- 5. (a)

TO：中華民國心臟學會
Fax：02-25976180
Re：通訊教育回覆單 (98.02)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____