

99 年度 7 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 99 年 8 月 20 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 根據 ACC/AHA guideline，何種狀況下，Brugada syndrome 患者可接受心內去顫器植入，屬於 class I indication: ?
- (a) 於藥物治療下，有猝死病史且預期壽命超過 1 年。
 - (b) 有昏厥病史且預期壽命超過 1 年。
 - (c) 有猝死病史且預期壽命少於 1 年。
 - (d) 有昏厥病史且預期壽命少於 1 年。
 - (e) 無藥物治療下，有猝死病史且預期壽命超過 1 年。
- () 2. Brugada syndrome 患者可能與哪個基因變異有關？
- (a) SCN5A gene
 - (b) Angiotensin II gene
 - (c) ApoE gene
 - (d) Pitx2
 - (e) Ikr gene
- () 3. CHADS score 是用來評估房顫患者的中風機率，其中並不包含以下何者？
- (a) 高血壓
 - (b) 心衰竭
 - (c) 心肌梗塞
 - (d) 糖尿病
 - (e) 年紀大於 75 歲

- () 4. 下列何者為非？
- (a) Alendronate 與 raloxifene 相較，並不增加房顫發生率。
 - (b) 左心耳經血管關閉術與 wafarin 相較，治療效果較佳。
 - (c) 新生房顫會影響血管手術的預後。
 - (d) 於 Finland 學者的研究中，後側心包膜切開術可以有意義減少預防房顫或心室上心律不整。
 - (e) 心肌梗塞併新生房顫患者會增加中風機會。
- () 5. 哪個藥物減少房顫患者中風機率的效果最好？
- (a) 抗凝血劑
 - (b) 阿斯匹靈
 - (c) Persantin
 - (d) Plavix
 - (e) Licodin

〔九十九年六月份通訊教育解答〕

- 1. (c)
- 2. (d)
- 3. (b)
- 4. (e)
- 5. (b)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (99.7)

會員編號

姓名

答案

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____