

100 年度 4 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 100 年 5 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 根據 ANDROMEDA 研究發現，新的心律不整藥物 Dronedarone 不應使用在那類病患？
- (a) 高血壓。
 - (b) 冠狀動脈心臟病。
 - (c) 嚴重心衰竭。
 - (d) 腎功能不全。
- () 2. 以下抗血小板及抗凝血藥物合併治療建議何者為非？
- (a) ACTIVE-W Trial 顯示 Warfarin 使用在高風險心房顫動族群發預防心血管事件明顯優於雙重抗血小板藥物治療 (Clopidogrel + Aspirin)。
 - (b) ACTIVE -W Trial 發現 Clopidogrel + Aspirin 治療組出血的副作用與 Warfarin 相當。
 - (c) ACTIVE-A Trial 發現在不適合使用 Warfarin 的心房顫動病患 Clopidogrel + Aspirin 能較單一 Aspirin 使用更降低血管事件風險。
 - (d) 合併使用 Clopidogrel、Aspirin 及 Warfarin 是臨床上遇到同時有 AF、mechanical valve prosthesis、drug-eluting coronary stent 時會考慮的治療策略。
- () 3. 關於 Dronedarone 的敘述何者為非？
- (a) Dronedarone 會抑制腎小管對 creatinine 的分泌但不影響腎絲球濾過率 (GFR)。
 - (b) Dronedarone 會增加 Digoxin 濃度 1.7-2.5 倍。
 - (c) Dronedarone 主要由肝臟代謝(CYP3A4)不建議與 diltiazem、verapamil 併用。
 - (d) Dronedarone 目前口服建議劑量為 400 mg/bid。

- () 4. 根據 RACE II 研究三年追蹤結果永久性心房顫動病患溫中心率控制是合理的治療策略將休息時心跳控制於多少以下即可接受？
- (a) < 60 bpm °
 - (b) < 80 bpm °
 - (c) <100 bpm °
 - (d) <110 bpm °
- () 5. 那種心律不整藥物是唯一證實可降低心房顫動病患的心血管死亡率？
- (a) Sotalol °
 - (b) Amiodarone °
 - (c) Propafenone °
 - (d) Dronedarone °

〔100年3月份通訊教育解答〕

1. (c)
2. (a)
3. (c)
4. (b)
5. (d)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (100.4)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

