

105 年度 7 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 105 年 8 月 20 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 對於急性下肢深層靜脈栓塞或肺動脈栓塞而無癌症病患的治療，以下敘述何者錯誤？
- (a) 至少使用三個月抗凝血劑
 - (b) 建議優先使用新型口服抗凝血劑如 Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, or Edoxaban
 - (c) 建議優先使用 Low Molecular Weight Heparin
 - (d) 不需常規使用血栓溶解劑
- () 2. 關於靜脈栓塞的病人抗凝血劑的使用持續時間，以下敘述何者錯誤？
- (a) 對於因手術而造成的病患抗凝血劑應超過 3 個月優於 3 個月的治療
 - (b) 有活動性癌症病患，如果不存在高出血危險，建議抗凝血劑應使用 Extended Therapy 優於 3 個月使用
 - (c) 對於因非手術之暫時性危險因子造成者，建議抗凝血劑應使用 3 個月的治療優於超過 3 個月使用
 - (d) 對於不明原因 (Unprovoked) 造成第二次靜脈栓塞病患，如果病人存在低程度之出血危險，建議抗凝血劑應使用 Extended Therapy 優於 3 個月使用
- () 3. 對於急性單獨下肢遠端深層靜脈栓塞病患，會繼續血栓延伸的危險因子不包括以下何者選項？
- (a) 血栓長度大於 5 公分、多條靜脈有血栓、血栓直徑大於 7mm
 - (b) 活動性癌症
 - (c) 靜脈栓塞病史
 - (d) 存在可逆性引發靜脈栓塞的因子

- () 4. 關於導管導向血栓溶解術 (Catheter-directed Thrombolysis) 治療急性靜脈栓塞的描述何者不正確？
- (a) 對於急性下肢近端深層靜脈栓塞病患，建議使用抗凝血劑治療優於導管導向血栓溶解術
 - (b) 可考慮在近端栓塞 (Iliofemoral Vein)
 - (c) 對於急性下肢近端深層靜脈栓塞病患症狀在 28 天內
 - (d) 對於急性肺栓塞患者，建議從靜脈全身性給予血栓溶解劑優於利用導管除去血栓治療
- () 5. 關於再發性靜脈栓塞之抗凝血劑治療何者正確？
- (a) 對於正在使用 VKA (在治療範圍) 仍再發性靜脈栓塞之病患，建議將正在使用之抗凝血劑暫時換成新型抗凝血劑
 - (b) 對於正在使用新型抗凝血劑 (藥物高順從者) 仍再發性靜脈栓塞之病患，建議將正在使用之抗凝血劑暫時換成 Low Molecular Weight Heparin
 - (c) 對於正在使 Low Molecular Weight Heparin (藥物高順從者) 仍再發性靜脈栓塞之病患，建議將 LMWH 劑量增加 1/2 劑量
 - (d) 對於正在使用抗凝血劑 (藥物高順從者) 仍再發性靜脈栓塞之病患，建議使用血栓溶解劑

〔105 年 6 月份通訊教育解答〕

- 1. (b)
- 2. (a)
- 3. (c)
- 4. (e)
- 5. (d)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (105.7)</p>	
會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

