

## 106 年度 7 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 106 年 8 月 21 日傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 下列何種狀況未建議於齒科術式前使用預防性抗生素？
- (a) 經心導管手術瓣膜置換
  - (b) 接受過二尖瓣環修補術以及人工腱索植入
  - (c) 曾有心內膜炎
  - (d) 二尖瓣脫垂症無瓣膜逆流者
  - (e) 未校正之發紺性先天性心臟病
- ( ) 2. 口服直接抗凝血劑 (DOACs) 不適用在以下那種有 Af 的病人？
- (a) Aortic Stenosis
  - (b) Aortic Regurgitation
  - (c) Mitral Stenosis
  - (d) Mitral Regurgitation
  - (e) Tricuspid Regurgitation
- ( ) 3. 有症狀的嚴重主動脈狹窄病人經評估為高手術風險時，以下哪個處置較為建議？
- (a) TAVR
  - (b) SAVR
  - (c) Percutaneous Aortic Balloon Dilatation (PABD)
  - (d) All of above
- ( ) 4. 低手術風險的有症狀嚴重主動脈狹窄適合以下哪個介入性治療？
- (a) TAVR
  - (b) TAVI
  - (c) SAVR
  - (d) All of above

- ( ) 5. 在 2017 AHA/ACC Guideline 的 Intermediate Surgical Risk 的病人，使用 TAVR 的建議強度為？
- (a) I
  - (b) IIa
  - (c) IIb
  - (d) III (No Benefit)
  - (e) III (Harm)

〔106 年 6 月份通訊教育解答〕

- 1. (e)
- 2. (c)
- 3. (e)
- 4. (d)
- 5. (e)

## 《更正啓示》

### 106 年 5 月會訊通訊教育第三題

- ( ) 3. 關於 Monoclonal Antibody 產生的心毒性，何者為非？
- (a) Trastuzumab 合併 Anthracyclines 一起使用的話，造成心衰竭的機率增加為 5.1 倍 (NYHA Fc Class III ) and 1.8 倍 (NYHA Fc Class III )。
  - (b) Trastuzumab 造成的心毒性跟其累積劑量是有正相關。
  - (c) Trastuzumab 造成的心毒性往往是急性的，主要在治療期間就會表現出來。
  - (d) Trastuzumab 造成左心室失能及心衰竭，只要停止給予 Trastuzumab 及給予藥治療經常是可逆的。
  - (e) 以上皆是。

※ 正確答案應為：(b)

〔106 年 5 月份通訊教育解答〕

1. (e) 2. (b) **3. (b)** 4. (d) 5. (d)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (106.7)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_

