

107 年度 11 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 107 年 12 月 15 日傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 根據流行病學統計，自發性冠狀動脈剝離好發於何種族群？
- (a) 50 歲以上的男性
 - (b) 50 歲以下的女性
 - (c) 50 歲以下的男性
 - (d) 50 歲以上的女性
- () 2. 根據本文獻，有關自發性冠狀動脈剝離的診斷何者正確？
- (a) 心肌酵素一定會升高。
 - (b) 心導管術為目前首選的診斷方法。
 - (c) 這類病人通常會有冠狀動脈疾病的風險因子，如吸煙、糖尿病等。
 - (d) 冠狀動脈電腦斷層造影 (Cardiac Computed Tomography Angiography) 解析度高，可有效排除自發性冠狀動脈剝離。
- () 3. 根據本文獻，有關自發性冠狀動脈剝離的治療何者錯誤？
- (a) 治療方案可分為保守治療、介入治療及手術治療。
 - (b) SCAD 的併發症常發生於發病 7 天內。
 - (c) 保守治療的藥物建議跟急性冠心症類似。
 - (d) 冠狀動脈繞道手術治療效果良好，預後也很好。
- () 4. 根據本文獻，如果心導管檢查中發現冠狀動脈剝離導致之瀰漫性血管狹窄自發性冠狀動脈剝離，在分類上屬於？
- (a) 第一型
 - (b) 第二型

- (c) 第三型
 - (d) 第四型
- () 5. 根據本文獻，自發性冠狀動脈剝離如果進行心導管檢查，以下方法可減少其併發症，除了：之發生
- (a) 避免導引導管 (Guiding Catheter) 過度深入。
 - (b) 避免顯影劑用力注入。
 - (c) 從橈動脈穿刺行心導管術。
 - (d) 保持導管跟冠狀動脈開口在同軸向。

〔107 年 10 月份通訊教育解答〕

- 1. (d)
- 2. (d)
- 3. (b)
- 4. (b)
- 5. (c)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (107.11)</p>	
會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

